

## Calendrier

### *Dès le 1er mois*

#### **Tuberculose (a)**

La vaccination BCG précoce est réservée aux enfants vivant dans un milieu à risques. La vaccination par le BCG est obligatoire (a) pour l'entrée en collectivité incluant la garde par une assistante maternelle. L'épreuve tuberculinique doit être pratiquée 3 à 12 mois plus tard.

### *A partir de 2 mois*

#### **Diphtérie (b) tétanos (b) coqueluche poliomyélite (b) infections invasives à *Haemophilus influenzae* (b) 3 injections à un mois d'intervalle**

Le vaccin polio injectable est utilisé pour les primo-vaccinations et les rappels, le vaccin polio oral réservé uniquement aux situations épidémiques. Le vaccin coqueluche à germes entiers est recommandé, mais le vaccin acellulaire peut être utilisé.

#### **Hépatite B 2 injections à un mois d'intervalle la 3ème entre 5 et 12 mois après la 2ème injection**

La vaccination contre l'hépatite B peut être commencée à partir de l'âge de 2 mois (sauf le cas des enfants nés de mère antigène HBs positif, chez qui elle doit être faite à la naissance)

### *A partir de 12 mois*

#### **Rougeole, oreillons, rubéole**

La vaccination associée rougeole-oreillons-rubéole (ROR) est recommandée pour les garçons et les filles. La vaccination contre la rougeole peut être pratiquée plus tôt, à partir de l'âge de 9 mois pour les enfants vivant en collectivité, suivie d'une revaccination six mois plus tard en association avec les oreillons et la rubéole. En cas de menace d'épidémie dans une collectivité d'enfants, on peut vacciner tous les sujets supposés réceptifs, à partir de l'âge de 9 mois. La vaccination immédiate peut être efficace si elle est faite moins de trois jours après le contact avec un cas.

#### **Hépatite B 3ème injection**

Cette 3ème injection peut être réalisée entre 5 et 12 mois après la date de la 2ème injection.

### **16-18 mois**

**Diphtérie  
tétanos  
coqueluche  
poliomyélite  
infections invasives  
à Haemophilus influenzae (b)  
1er rappel**

Le vaccin coqueluche à germes entiers ou le vaccin acellulaire peuvent être utilisés différemment.

Lors du 1er rappel « DTPHibCoq » on peut, si nécessaire, pratiquer en un site d'injection séparé, la vaccination associée rougeole-oreillons-rubéole.

### **Entre 3 et 6 ans**

**Rougeole, oreillons, rubéole  
2ème dose**

Une seconde vaccination associant rougeole, oreillons, rubéole est recommandée pour tous les enfants.

### **Avant 6 ans**

**Tuberculose**

La vaccination BCG est obligatoire pour l'entrée en collectivité, donc pour l'entrée à l'école maternelle ou en primaire.

### **6 ans (c)**

**Diphtérie  
tétanos  
poliomyélite 2ème rappel  
Rougeole-oreillons-rubéole**

A l'occasion du 2ème rappel diphtérie, tétanos, polio et/ou le BCG, il est recommandé de faire la vaccination associée rougeole-oreillons-rubéole chez les enfants n'ayant pas encore été vaccinés ou n'ayant reçu qu'une dose de ROR, éventuellement le même jour.

### **11-13 ans**

**Diphtérie  
tétanos  
poliomyélite 3ème rappel,  
Coqueluche 2ème rappel**

Un rappel tardif contre la coqueluche est recommandé chez tous les enfants, l'injection devant être effectuée en même temps que le 3ème rappel diphtérie, tétanos, polio avec le vaccin coquelucheux acellulaire.

**Rougeole, oreillons, rubéole  
rattrapage**

Une dose de vaccin triple associé rougeole, oreillons, rubéole est recommandée pour tous les enfants n'en ayant pas bénéficié, quels que soient leurs antécédents vis-à-vis des trois maladies.

**Hépatite B**

Si la vaccination n'a pas été pratiquée dans l'enfance, un schéma complet en trois injections : les deux premières à au moins un mois d'intervalle, la 3ème 5 à 12 mois après la

date de la deuxième injection.

**Epreuve tuberculique**

Les sujets aux tests tuberculiques négatifs, vérifiés par IDR, seront vaccinés ou revaccinés.

***16-18 ans***

**Diphthérie,  
tétanos,  
poliomyélite 4ème rappel**

Rappels ultérieurs tétanos et polio tous les dix ans.

**Rubéole**

La vaccination contre la rubéole est recommandée pour les jeunes femmes non vaccinées, par exemple lors d'une consultation de contraception ou pré-nuptiale.

***A partir de 18 ans***

**Tétanos, poliomyélite**

Tous les dix ans

**Rubéole**

Pour les femmes non vaccinées en âge de procréer. Si la sérologie prénatale est négative ou inconnue, la vaccination devra être pratiquée immédiatement après l'accouchement, avant la sortie de la maternité.

***A partir de 65 ans***

**Grippe**

Tous les ans.